

## MEDIASTrial - Protocol anatomische resectie en lymfeklierdissectie

Gebaseerd op: “Richtlijn NSCLC: stadiering en behandeling” (IKNL, 2011), ‘Surgery for early stage non-small cell lung cancer’ (Manser, 2005) en ‘Medastinal lymph node dissection versus mediastinal lymph node sampling for early stage non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis’ (Huang, 2014).

### Methode:

- Resectie van het aangedane deel van de long aangevuld met longkwab specifieke mediastinale lymfeklier dissectie
- Station 12 wordt ‘en bloc’ gereseceerd, station 10 en 11 worden bij alle kwaben gereseceerd
- Rechter boven- of middenkwab: dissectie station 2R, 4R, 7
- Rechter onderkwab: dissectie station 4R, 7, 8 en 9
- Linker bovenkwab: dissectie station 5, 6 en 7
- Linker onderkwab: dissectie station 7, 8 en 9

### Referenties

- Integraal kankercentrum Nederland. Richtlijn NSCLC: stadiering en behandeling. Oncoline. 2011 March 28; (1). [www.oncoline.nl](http://www.oncoline.nl)
- Huang X, Wang J, Chen Q, Jiang J. Mediastinal lymph node dissection versus mediastinal lymph node sampling for early stage non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2014 Oct 8;9(10)
- Manser R, Wright G, Hart D, Byrnes G, Campbell DA. Surgery for early stage non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jan 25;(1)